


地点



DSC 诊所

31 Kelantan Lane #01-16 S(200031)

巴士服务

23, 64, 65, 66, 67, 130, 139, 147, 857

最靠近的地铁站

武吉士 (东西线 / 市区线)	劳明达 (东西线)
花拉公园 (东北线)	梧槽 (市区线)
惹兰勿剎 (市区线)	

爱之病 / 性病录音资讯线
6295 2944

爱之病 / 性病热线
1800 - 2521324 (办公时间)

与我们预约

请拨打
6293 9648 预约中心
或电邮至
apptdsc@nsc.com.sg 预约

更多诊所资料请查阅网址 WWW.DSC-CLINIC.SG
或上我们的脸书 WWW.FACEBOOK.COM/DSCSG

非淋菌性尿道炎 NON-GONOCOCCAL URETHRITIS (NGU)



NATIONAL SKIN CENTRE

非淋菌性尿道炎 (NGU) 是什么？

非淋菌性尿道炎 (NGU)是指并非由淋病而引起的男性尿道的炎症（将尿液从膀胱输送到体外）。大约三分之二的非淋菌性尿道炎是因性病所引起，而最常见的是衣原体感染。由其他性病感染所引起的感染例如：疱疹、滴虫或支原体感染，但并非所有性病感染都能够进行检测或检验。在三分之一的感染中也可能是非性病所引起。有时，也可能是受到刺激或化学物质而致。

此感染仅在男性中才能诊断出，但女性伴侣也可能受到同一种细菌感染而未呈现任何症状。

非淋菌性尿道炎(NGU)是如何传播？

非淋菌性尿道炎 (NGU) 是通过人与人的性接触所传播例如-阴道交、口交和肛交的性行为而受感染。

有哪些症状或体征？

症状包括：

- 尿道会有流出分泌物（透明、白色或黄色的颜色）
- 小便时有烧灼感
- 在阴茎的顶部会有发痒或刺激的症状

因为症状可能类似于淋病感染，所以诊所会进行化验室检测才能确认诊断结果。

何时会出现症状或体征？

症状经常会在感染后约 1 至 3 周时出现。

如何诊断非淋菌性尿道炎？

诊所会在阴茎的尖端采取分泌物而通过显微镜观察是否有任何感染。

脓细胞 (Pus Cell)显示发炎可能是由性病而感染。诊所也会同时进行淋病和衣原体尿液检测。

非淋菌性尿道炎(NGU)是否能治愈？

非淋菌性尿道炎(NGU)通常会采用抗生素以进行治疗。少数的患者也可能需要较长或多一剂的处方以根治病情。

因为非淋菌尿道炎是通过性行为而感染，即时您的性伴侣没有出现任何症状，他们也是需要接受治疗，以确保您不会有重新感染的可能性。

非淋菌性尿道炎(NGU)是否能引起其他并发症？

如果非淋菌性尿道炎 (NGU) 是由性病（尤其是衣原体细菌）所感染而未进行任何治疗，感染会导致其他的并发症如：

- 扩散到生殖器官（如睾丸和附睾），而引起疼痛和肿胀
- 可能导致不育和皮肤、关节与眼睛的并发症
- 未经治疗的女性也可能出现盆腔感染、不育、异位妊娠和宫外孕

我是否需要返回以接受随访访视？

- 在 DSC 诊所，患者将被安排回来复诊，作为性病管理的一部分。
- 对于非淋菌性尿道炎感染，在治疗后的14天，男性患者需要复诊以进行同样的检测。患者必需在进行检测前憋尿 4 小时，以确保获得准确的检验结果。
- 患者也会被安排在 3 个月后来复诊以进行梅毒血液检测。

注意事项

- 立刻就医，不要进行自我治疗。
- 告知医生任何药物过敏的情况。
- 治疗前竟可避免发生性行为。
- 完成诊所开的处方。
- 竟可让您的性伴侣进行检测，以便他/她能及早接受治疗。
- 与非固定的性伴侣和性工作发生性行为时，竟可进行安全防范措施的性行为。

进行较安全性行为

- 进行无体液(阴道分泌或精液)交流的性行为。
- 每次进行性行为都正确的使用安全套
- 避免在进行性行为前/时过量饮酒，因为这将影响您的判断力

免责声明

根据目前的医学证据与意见，我们试图在病人治疗册上提供最全面与最新的信息。然而，不同的资料来源与随着时间的推移，信息与意见可能有所不同。您若有任何问题，请咨询您的医生或医疗人员。