


## 地点



### DSC 诊所

31 Kelantan Lane #01-16 S(200031)

### 巴士服务 (维拉三美路对面)

23, 64, 65, 66, 67, 130, 139, 147, 857

### 最靠近的地铁站

武吉士 (东西线 / 市区线)

劳明达 (东西线)

花拉公园 (东北线)

梧槽 (市区线)

惹兰勿刹 (市区线)

爱之病/性病录音资讯线

6295 2944

爱之病/性病热线

1800 - 2521324 (办公时间)

## 与我们预约

请拨打

6293 9648 预约中心

或电邮至

apptdsc@nsc.com.sg 预约

更多诊所资料请查阅网址 [WWW.DSC-CLINIC.SG](http://WWW.DSC-CLINIC.SG)  
或上我们的脸书 [WWW.FACEBOOK.COM/DSCSG](http://WWW.FACEBOOK.COM/DSCSG)

## B型肝炎 HEPATITIS B

## 什么是B型肝炎 (hepatitis B) ?

B型肝炎是一种感染血液和肝脏的病毒。它可导致肝炎，造成长期性肝脏疾病。

## B型肝炎怎么传染?

- 与病毒感染者发生无防护的性行为（如阴道交、肛交或较不寻常的情况如口交）
- 输入受病毒感染的血液制品
- 共用被污染的注射针具
- 受感染的孕妇可能在分娩过程中将病毒传染给婴儿
- 共用沾有污染血液的个人卫生用品如剃须刀、牙刷等

## B型肝炎有哪些症状?

- 轻微发烧
- 腹痛
- 尿色变深、皮肤及眼白发黄（黄疸病）
- 食欲不振、恶心、呕吐
- 在十分罕见情况下，会引发严重致命的肝炎

大部分B型肝炎患者是没有任何症状，未经检查诊断，甚至不知道自己已经被感染。

## B型肝炎什么时候出现症状?

在感染后的1至6个月才会出现症状

## 哪些人应该接受检查?

凡是未注射过疫苗或检查:

- 与性工作者或多个性伴侣进行不安全的性行为
- 曾被针头刺伤或注射过软性毒品者
- 您的性伴侣或家中有受感染B型肝炎带菌者
- 男性与男性之间发生过性行为
- 受感染爱之病毒患者

## 如何诊断B型肝炎?

通过验血来检测:

- 血液中是否带有病毒
- 接触病毒时或注射疫苗后，身体是否产生抗体

## B型肝炎是否可以治愈?

B型肝炎目前虽然无法根治，但带菌者可借助药物对抗或清除病毒，详情请向医生咨询。

## B型肝炎会引起哪些并发症?

大多数人感染B型肝炎病毒后，都会自动清除病毒，并产生抗体。但有部分感染者却无法清除病毒而成为长期B型肝炎带菌者并且患上肝癌或肝衰竭的风险也会提高。

## B型肝炎对怀孕的影响

受感染的孕妇请务必通知妇产科医生，以在怀孕或分娩过程中采取积极预防和恰当的治疗措施，确保新生儿免受感染。

## 重要提示

如果你从未注射过疫苗，也不属于曾经感染病毒、已经治愈而产生免疫力的群体，就应该注射疫苗。B型肝炎疫苗系列包括6个月期间，分别进行三次注射，注射后大约95%的人可以产生长期的免疫力。

- 发生性行为时请使用安全套以避免感染或把病毒传染给对方。
- 如您是带菌者，您应该定期的进行肝功能检测以便能发现任何有关肝癌的早期突变或迹象。
- 如您是带菌者，请务必预先通知您的医生或牙医在进行任何侵入性的程序或手术以采取适当的访范措施。

## 进行较安全性行为

- 进行无体液（阴道分泌或精液）交流的性行为
- 每次进行性行为都正确的使用安全套
- 避免在进行性行为前/时过量饮酒，因为这将影响您的判断力

## 免责声明

根据目前的医学证据与意见，我们试图在病人治疗册上提供最全面及正确与最新的信息。然而，不同的资料来源与随着时间的推移，信息与意见可能有所不同。您若有任何问题，请咨询您的医生或医疗人员。